

# On recherche des informations sur les loutres africaines

Il y a 13 espèces de loutres dans le monde. La plupart d'entre elles sont menacées. Les loutres sont d'excellents indicateurs de la qualité des zones humides, car elles sont en fin de chaîne alimentaire au sein de divers habitats semi-aquatiques.


En Afrique, quatre espèces de loutres existent mais nous connaissons peu de choses à leur propos.

## La loutre à joues blanches du Cap

Elle est présente dans la plupart des régions de l'ouest, de l'est et du sud de l'Afrique, au sud du Sahara.



Photo: Caterina Carugati



## La loutre à joues blanches du Congo

Sa répartition se limite au bassin du Congo.





Photo: Urs Rahm




## La loutre à cou tacheté

Elle est présente dans la plupart des régions de l'ouest, du centre et du sud-est de l'Afrique, au sud du Sahara.



Photo: Claus Reuther




## La loutre eurasiatique

Sa répartition en Afrique est limitée à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie, au nord du Sahara.



Photo: Aktion Fischotterschutz



Le groupe des spécialistes des loutres de la *Commission de la Sauvegarde des Espèces (CSE)* de l'*UICN (Union mondiale pour la nature)*, en coopération avec l'*Association Allemande pour la conservation des loutres (Aktion Fischotterschutz)*, le *WWF (Fonds Mondial pour la Nature)* d'Afrique du Sud et le *Mazda Wildlife Fund* a initié un programme pour mieux connaître la distribution des loutres en Afrique. Nous vous demandons d'avoir la gentillesse de nous aider en nous fournissant vos observations de loutres.

## Les loutres à joues blanches (ou loutres dépourvues de griffes)

La différenciation de ces deux espèces de grosses loutres (environ 15 à 25 kg) demande de l'expérience et certains critères d'identification n'étant pas encore parfaitement clairs, ces deux espèces sont traitées ensemble. Elles peuvent être décrites ainsi:

### Pied avant (Grandeur réelle)




Photo: David Rowe-Rowe



Photo: Caterina Carugati



Photo: David Rowe-Rowe



Photo: Claus Reuther

**La loutre à joues blanches du Cap (*Aonyx capensis*):** Parties supérieures du corps brun chocolat foncé, gris brun ou brun roux. Ventre plus clair. Menton, gorge, partie supérieure de la poitrine, côtés du cou, et joues jusqu'au dessous des yeux et des oreilles, blancs ou blanchâtres. Vibrisses (moustaches) longues et nombreuses. Doigts des pattes antérieures sans griffe ni palmure, doigts des pattes postérieures avec petite palmure jusqu'à la deuxième phalange et tout petits ongles sur les 2<sup>e</sup>, 3<sup>e</sup>, 4<sup>e</sup> doigts. Ligne supérieure du rhinarium (truffe du nez) légèrement arrondie ou en forme de «V».

**La loutre à joues blanches du Congo (*Aonyx congicus*):** Couleur du corps sépia. Poitrine, gorge, menton et côtés de la tête et du nez, blancs. Bord des oreilles blanc. Une grande tache quadrangulaire noire et voyante, entourée de blanc, entre l'œil et le nez. Tête et cou de couleur givrée. Vibrisses (moustaches) plus courtes et moins nombreuses que chez la loutre à joues blanches du Cap. Doigts identiques à ceux de la loutre à joues blanches du Cap. Ligne supérieure du rhinarium (truffe du nez) droite.

### Pied arrière (Grandeur réelle)




Photo: Christian R. Schmidt



Photo: Urs Rahm




Photo: Christian R. Schmidt



Photo: Urs Rahm



## Pied avant (Grandeur réelle)



## La loutre à cou tacheté (*Lutra maculicollis*)

Loutre petite et fine (3 à 8 kg). Sombre, corps entièrement brun noir. Gorge et poitrine peuvent avoir des taches blanches ou crème (dont la quantité varie) ou peuvent être brun noir. Lèvres blanches quelquefois. Les 5 doigts des quatre pattes sont reliés par des palmures et ont des griffes.



Photo: Claus Reuther

## Pied arrière (Grandeur réelle)




Photo: Claus Reuther




Photo: Claus Reuther




Photo: Claus Reuther

Si vous êtes intéressés par la conservation des loutres en Afrique vous pouvez contacter :

Prof. Jan Nel  
Continental Coordinator for Africa  
IUCN/SSC Otter Specialist Group  
University of Stellenbosch  
Private Bag X1  
Matieland  
7602 Stellenbosch  
SOUTH AFRICA  
Fax: +27-21-808 2405  
e-mail: jan@maties.sun.ac.za

Dr. Hélène Jacques  
Représentante pour les Etats  
Francophones d'Afrique,  
pour le groupe loutre de l'IUCN  
13, place de Verdun  
38320 Eybens  
FRANCE  
Fax: +33-4-76-62 07 17  
e-mail: h.jacques.otter@wanadoo.fr

Claus Reuther  
Chairman IUCN/SSC Otter Specialist  
Group  
Aktion Fischotterschutz e.V.  
OTTER-ZENTRUM  
29386 Hankensbüttel  
GERMANY  
Fax: +49-5832-980851  
e-mail: c.reuther@otterzentrum.de

## Avez-vous vu des loutres?

### Où la loutre a-t-elle été vue?

Donner l'emplacement exact (le plus précis possible) avec les coordonnées géographiques (mentionner SVP le système géodésique que votre carte ou votre GPS utilise) ou la proximité d'une ville, d'un village, d'une montagne ou d'un nom qui peut être trouvé sur une carte. Par exemple rivière Achwa à 10 km au nord d'Omoro en Ouganda.

**Quand la loutre a-t-elle été vue?** Date (jour/mois/année), moment de la journée (lever du jour, matin, midi, après-midi, soir, nuit)

**Dans quel type d'habitat la loutre a-t-elle été vue?**  rivière  marécage  lac  bord de mer (faire une croix)

**Combien de loutres ont été vues ensemble?** ① ② ③ ④ ⑤ ○ (faire une croix ou donner le nombre)

**Quel est le nom commun pour les différentes espèces de loutres dans votre région ?**

Loutre eurasiatique: \_\_\_\_\_ Loutre à cou tacheté: \_\_\_\_\_

Loutre à joues blanches: \_\_\_\_\_ Loutres en général: \_\_\_\_\_

Langage/dialecte: \_\_\_\_\_ Pays/région: \_\_\_\_\_

**Avez-vous des problèmes avec les loutres, ou y a-t-il des problèmes avec les loutres dans votre région?**

Mangent-elles le poisson que vous essayez d'attraper?  Oui  Non (faire une croix)

Détruisent-elles les nasses ou les filets pour attraper les poissons?  Oui  Non (faire une croix)

Informations complémentaires: \_\_\_\_\_

**Y a-t-il des produits provenant de loutres sur le marché local (peau/viande) ?**  Oui  Non (faire une croix)

Si oui, pouvez vous nous donner des détails \_\_\_\_\_

**La loutre eurasiatique (*Lutra lutra*)**

Loutre de taille moyenne (5 à 12 kg). Fourrure uniformément brun foncé. Région de la gorge et de la lèvre inférieure grise à blanche. Marques fréquentes sur la gorge, grises, blanches ou jaunes, variables d'un individu à l'autre. Les 5 doigts des quatre pattes sont reliés par des palmures et ont des griffes. Grandes vibrisses. La ligne supérieure du rhinarium (truffe du nez), noir et sans poil, forme un «W».



Photo: Claus Reuther



Photo: Claus Reuther




Photo: Claus Reuther




Photo: Claus Reuther

**Pied avant (Grandeur réelle)**



**Pied arrière (Grandeur réelle)**



**Expéditeur:**

Prénom \_\_\_\_\_  
 Nom de famille \_\_\_\_\_  
 Fonction \_\_\_\_\_  
 Adresse postale \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Fax no \_\_\_\_\_  
 Adresse e-mail \_\_\_\_\_

envoyez moi d'autres dépliants ( \_\_\_ copies)  
 en Anglais  en Français  en Portugais  
 ( \_\_\_ copies) ( \_\_\_ copies) ( \_\_\_ copies)

Envoyez aussi ce dépliant à:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**IUCN/SSC  
 Otter Specialist Group  
 OTTER-ZENTRUM  
 29386 Hankensbüttel  
 GERMANY**

© 2002  
 IUCN/SSC Otter Specialist Group  
 c/o Aktion Fischotterschutz e.V.  
 OTTER-ZENTRUM  
 29386 Hankensbüttel  
 GERMANY  
 e-mail: afs@otterzentrum.de

Editeurs: Claus Reuther, Jan Nel, David Rowe-Rowe  
 Traduction en français: Hélène Jacques, François Moutou  
 Traduction en portugais: Anabela Trindade

Ce dépliant est disponible en anglais, français et portugais

Il peut aussi être téléchargé en dossier pdf sur internet ([www.otterspecialistgroup.org/leaflets.html](http://www.otterspecialistgroup.org/leaflets.html))

L'édition de ce dépliant a été possible grâce au support du WWF Afrique du Sud et du The Mazda Wildlife Fund.